


**HARBORVIEW MEDICAL CENTER
CHILDREN'S CLINIC PHARMACY
PHONE 731-2282**

**មន្ទីរពេទ្យហាប៊ែរវិយូ
ហ្វារម៉ាស៊ីសម្រាប់គ្លីនិកកូនក្មេង
ទូរស័ព្ទ ៧៣១-២២៨២**

**How to Treat your Child's Cough or
Cold at Home**

**ត្រូវព្យាបាលរោគក្អក ឬផ្តាសាយ
របស់កូនលោកអ្នកនៅផ្ទះបែបណា**



ត្រូវទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកនៅពេលណា?

- កូនរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការដកដង្ហើម ឬដកដង្ហើមកាន់តែញាប់។
- កូនរបស់លោកអ្នកមានជម្ងឺគ្រុនក្តៅលើសពីបីថ្ងៃ។
- កូនរបស់លោកអ្នកមានការហៀរសំបោរលើសពី១៥ថ្ងៃ។
- កូនរបស់លោកអ្នកចាប់ឈឺគ្រុឡែក។
- កូនរបស់លោកអ្នកមានជម្ងឺគ្រុនញាក់ឬពិបាកក្នុងខ្លួន។
- កូនរបស់លោកអ្នកចេះតែហៀរទឹកភ្នែក។
- ការក្អករបស់កូនលោកអ្នកកាន់តែខ្លាំងឡើងឬដូចព្រុស។
- កូនរបស់លោកអ្នកក្អកជាប់ជាង២សប្តាហ៍។
- កូនរបស់លោកអ្នកមានការឈឺក្បាលឬរោយក។
- កូនរបស់លោកអ្នកឈឺបំពង់ក ដែលអស់រយៈពេលជាង៤៨ម៉ោង។
- កូនរបស់លោកអ្នកមានអាយុតិចជាង២ខែ ហើយមានកម្ដៅខ្ពស់ពីធម្មតា។
- កូនរបស់លោកអ្នកអាយុតិចជាង២ឆ្នាំ ហើយមិនព្រមញុំាជាតិទឹក។
- កូនរបស់លោកអ្នកហាក់បីដូចជាឈឺខ្លាំងជាងដែលមានជម្ងឺផ្តាសាយ ឬក៏លោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភ។

Cambodian

អ្វីទៅគ្រុនផ្តាសាយ?

គ្រុនផ្តាសាយជាធម្មតាវាឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ដោយសារប៉ះពាល់មនុស្ស ដែលមានផ្តាសាយ ឬក៏ប៉ះពាល់នូវអ្វីដែលមនុស្សមានជម្ងឺបានកាន់ (ដូចជាខ្លាវ) --ហើយបន្ទាប់មក យកមកប៉ះមាត់ឬភ្នែករបស់លោកអ្នក។

គ្រុនផ្តាសាយអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាក៏បាននៅក្នុងផ្ទះ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ច្រើនកើតនៅ ខែរងា។ ជាទូទៅកូនក្មេងគ្រុនផ្តាសាយ៦ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្មេងដែលនៅ កន្លែងមើលកូនក្មេងពេលថ្ងៃ ឬកូនក្មេងដែលនៅក្នុងផ្ទះមធ្យម អាចនឹងកើតគ្រុនផ្តាសាយនេះច្រើន ជាង។

លក្ខណៈសម្គាល់គ្រុនផ្តាសាយជាធម្មតា គឺហ្សៀវសំបោរ, កណ្តាស់, ឈឺបំពង់កតិចៗ, ក្អកនិង ក្អកខ្លួនបន្តិច។ គ្រុនផ្តាសាយភាគច្រើនមានរយៈពេលមួយទៅពីរសប្តាហ៍ទើបជា ហើយបន្តទៅមុខ ហ្សៀវសំបោរថ្លា និងប្រហែលជាឈឺបំពង់កបន្តិច កំហាករាងខាប់និងតឹងច្រមុះហើយក្អកផង។

ការសំខាន់របស់ជម្ងឺគ្រុនផ្តាសាយគឺ ការការពារ លាងដៃរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពី ក្រៅផ្ទះ ហើយប្រាប់ទៅកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ ត្រូវមើលឲ្យកូនក្មេងគេឲ្យបាន ស្តាប់និងញាំឲ្យបានផ្អែមត្រូវ ការនេះអាចជួយការពារជម្ងឺផ្តាសាយ។ សម្រាប់កូនង៉ា (អាយុតិច ជាងពីរខែ) ជៀសវាងទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជម្ងឺផ្តាសាយ ហើយជៀសវាងទីប្រជុំជុំន និងកន្លែងដែលប្រហែលជា មានអ្នកដែលមានជម្ងឺផ្តាសាយ។

គ្មានការ “ព្យាបាល” សម្រាប់គ្រុនផ្តាសាយឡើយ ខ្លួនរបស់យើងគាត់ជាមួយនឹងជម្ងឺផ្តា សាយ ដោយមិនត្រូវការប្រើថ្នាំឡើយ ហើយយើងក៏មិនអាចនឹងធ្វើឲ្យជាសះស្បើយរហ័សដោយប្រើ ថ្នាំដែរ។ ថ្នាំអែនទីប៊ីយោទីក (ដូចជា អាម៉ូស៊ីស៊ីលីន) មិនអាចជួយគ្រុនផ្តាសាយបានឡើយ។ ផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលយើងអាចនឹងធ្វើបានសម្រាប់កូនក្មេង គឺជួយឲ្យបានស្រួលតាមដែលអាចធ្វើ ទៅបាន ហើយរង់ចាំរោគនោះជាដោយខ្លួនឯង។

Cambodian

ការព្យាបាលនៅផ្ទះ

នោះបីមានមនុស្សជាច្រើនប្រើថ្នាំ ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនរបស់គេបានគ្រាន់បើនៅពេលវាគ្រុន មានផ្ទះ ជាច្រើនលោកអ្នកអាចធ្វើបាន សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកនៅផ្ទះ ដែលប្រហែលជាគ្រាន់បើជាងឲ្យ ថ្នាំ។

១) ឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកញ៉ាំជាតិទឹកឲ្យបានច្រើន ក្មេងជាច្រើនញ៉ាំបាយមិនសូវបានទេនៅពេល ដែល វាគ្រុន ហើយប្រហែលជាញ៉ាំជាតិទឹកតិចដែរ។ ដោយលើកទឹកចិត្តវាឲ្យញ៉ាំជាតិទឹក លោកអ្នកនឹង ជួយធ្វើឲ្យជាតិសំបោរនោះថ្លា ហើយធ្វើឲ្យវាស្រួលខ្លួនផង។

២) ប្រើទឹកថ្នាំដែលមានជាតិអំបិលសម្រាប់បន្តក់ និងសារវាងសម្រាប់បូម ឬក៏ថ្នាំដែលមានជាតិ អំបិលសម្រាប់បាញ់ដើម្បីបំបាត់សំបោរ។ សូមអានលិខិតណែនាំ ដែលមាននៅក្នុងហ្វាម៉ាស៊ី ដើម្បីឲ្យ ដឹងថាត្រូវរៀបចំថ្នាំមានជាតិអំបិល ហើយនិងរបៀបប្រើសារវាងសម្រាប់បូមយ៉ាងណា។

៣) បើសិនជាលោកអ្នកមានម៉ាស៊ីនឆ្លើម Humidifier ម៉ាស៊ីននោះនឹងជួយ ឆ្លើមច្រមុះ, មាត់, និង បំពង់ក ធ្វើឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកបានស្រួលខ្លួន។

៤) សូមប្រើវ៉ាស្កូលីន (ក្រមួន) នៅក្បែរច្រមុះរបស់កូនលោកអ្នក ដើម្បីជួយកុំឲ្យឈឺ។

៥) ត្រូវឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកសម្រាកបានច្រើន មិនជាការចាំបាច់នឹងហាមឃាត់មិនឲ្យវាលេង ឬក៏ យាត់មិនឲ្យវាទៅសាលារៀន ឬក៏នឹងមើលកូនក្មេងពេលថ្ងៃទេ ប៉ុន្តែបន្ថយសកម្មភាពវាបន្តិច ប្រហែលជាអាចនឹងជួយវាឲ្យស្រួលខ្លួន។

៦) សូមចងចាំថាគ្រុនក្មេងមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទេ គ្រុនក្មេងប្រហែលជាអាច ជួយប្រឆាំងនឹងការ ផ្តាសាយ។

Cambodian

តើថ្នាំមុខណាដែលខ្ញុំអាចឲ្យកូនខ្ញុំបាន?

មានថ្នាំជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាច នឹងទិញបាននៅផ្សារសម្រាប់ក្មេងនិងផ្កាសាយ មិនមានព័ត៌មានច្បាស់ថាថ្នាំទាំងនេះអាចនឹងជួយកូនក្មេងបានប៉ុណ្ណាទេ។ មានឪពុកម្តាយខ្លះមានអារម្មណ៍ថា ថ្នាំផ្កាសាយនោះអាចជួយឲ្យកូនខ្លួនបានគ្រាន់បើ មានឪពុកម្តាយខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍ថាថ្នាំនោះមិនជួយសោះ។ គឺជាការល្អដែលត្រូវដឹងថា កូនរបស់លោកអ្នកនឹងជាពីការផ្កាសាយ ក្នុងរយៈពេលមួយទៅពីរសប្តាហ៍ដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំ។ របៀបព្យាបាលការផ្កាសាយខ្លះនៅក្នុងទំព័រមុននេះ ប្រហែលជាអាចជួយបានច្រើនជាងថ្នាំ។ ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ថ្នាំអាចជួយកូនរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកគួរតែប្រើវា។

ថ្នាំក្អក

- រ៉ូប៊ីថាស់សិន ROBITUSSIN® (ដូចគ្នានឹងខ្លែហ្វីនីស៊ីន)
- រ៉ូប៊ីថាស់សិន ឌីអ៊ីម (ដូចគ្នានឹងខ្លែហ្វីនីស៊ីន និងដែក្សត្រូម៉េថូហ្វីន)

ថ្នាំផ្កាសាយ

- ដៃម៉េដែប DIMETAPP®
ឈ្មោះសាមញ្ញសម្រាប់ថ្នាំផ្កាសាយនេះ គឺជាថ្នាំដែលលាយគ្នាពីរមុខៈ ប្រូហ្វីនីវ៉ាមីន និងហ្វីនីលប្រូប៉ាណុលឡាមីន។
- ស៊ូដាហ្វែត SUDAFED® (ដូចគ្នានឹង សើដូអ៊ីហ្វីត្រីន)

ថ្នាំសម្រាប់ក្តៅខ្លួន

- ថែឡាណុល TYLENOL® (ដូចគ្នានឹងអាស៊ីតាមីណូហ្វីន)
- ថ្នាំនេះជួយសម្រាប់ក្តៅខ្លួន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចជួយជម្ងឺដែលឈឺធ្ងន់ពេកនោះទេ។

Cambodian

