

អំពីជំងឺរលាកថ្លើម

	ជំងឺរលាកថ្លើមជំពូកអេ (HAV)	ជំងឺរលាកថ្លើមជំពូកប៊ី (HBV)	ជំងឺរលាកថ្លើមជំពូកស៊ី (HCV)	ជំងឺរលាកថ្លើមជំពូកអិ (HDV)	ជំងឺរលាកថ្លើមជំពូកអី (HEV)
តើជំងឺរលាកថ្លើមជាអ្វី?	HAV គឺជាវីរុស (virus) ធ្វើឱ្យថ្លើមរលាក មិនបណ្តាលឱ្យទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទេ។	HBV គឺជាវីរុសធ្វើឱ្យកើតរោគ រលាកថ្លើម។ វាអាចធ្វើឱ្យកោសិការបស់ថ្លើមខូច ហើយបណ្តាលឱ្យក្លាយជាថ្លើមរឹងនិងជំងឺមហារីក។	HCV គឺជាវីរុសធ្វើឱ្យកើតរោគ រលាកថ្លើម។ វាអាចធ្វើឱ្យកោសិការបស់ថ្លើមខូចខាត ហើយបណ្តាលឱ្យក្លាយជាថ្លើមរឹងនិងជំងឺមហារីក។	HDV គឺជាវីរុសធ្វើឱ្យថ្លើមរលាក។ វីរុសនេះ វាមានឥទ្ធិពលតែចំពោះអ្នកមាន HBV ។	HEV គឺជាវីរុសធ្វើឱ្យកើតរោគ រលាកថ្លើម។ វាមិនសូវកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេ ហើយក៏មិនមានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃដែរ។
កំឡុងពេលដែលជំងឺមិនទាន់ចេញមុខ	២ទៅ៧សប្តាហ៍ ជាមធ្យម៖ ៤សប្តាហ៍	៦ទៅ២៣សប្តាហ៍ ជាមធ្យម៖ ១៧សប្តាហ៍	២ទៅ២៥សប្តាហ៍ ជាមធ្យម៖ ៧ទៅ៩សប្តាហ៍	២ទៅ៨សប្តាហ៍	២ទៅ៩សប្តាហ៍ ជាមធ្យម៖ ៤០ថ្ងៃ
តើវាឆ្លងដោយរបៀបណា?	ឆ្លងតាមលាមកនិងមាត់ (ការរួមភេទដោយប្រើមាត់) ការប៉ះពាល់គ្នា ឬទទួលបានអាហារនិងទឹកមានមេរោគនោះ។ ដៃប្រឡាក់លាមកដូចជាការប្តូរកន្ទួត អាច ឆ្លងពីដៃចូលមាត់បាន។	ប៉ះនឹងឈាម និងទឹកកាមដែលមានមេរោគហើយនិងម្តូល និងគ្រឿងប្រដាប់ចោះរាងកាយដែលមានប្រឡាក់មេរោគ។ ពីម្តាយមានមេរោគទៅទារក មនុស្សខាំ និងការរួមភេទ។	ប៉ះនឹងឈាម ម្តូលចាក់ ឡាម និងប្រដាប់ប្រដារសំរាប់ចោះឬសាក់ខ្លួនដែលបានប្រឡាក់មេរោគ។ ពីម្តាយមានមេរោគទៅទារក។ មិនសូវងាយឆ្លងដោយការរួមភេទទេ។	ប៉ះនឹងឈាម និងម្តូលដែលបានប្រឡាក់មេរោគ។ ការរួមភេទជាមួយអ្នកដែលមាន HDV ។	ឆ្លងដោយការប៉ះពាល់នឹងលាមកចូលទៅមាត់។ មនុស្សជាច្រើននៅប្រទេសផ្សេងៗកើតមានមេរោគនេះក្នុងពេលតែមួយដោយព្រោះតែនៅក្នុងទឹកមានមេរោគនោះ។
រោគសញ្ញា	អាចមិនមានរោគសញ្ញាទេ។ អ្នកខ្លះអាចមានលាមកពណ៌ខ្ចី ទឹកនោមមានពណ៌មិនប្រក្រតី ការអស់កម្លាំង គ្រុនក្តៅ ដំណើរចង់ក្អួត ក្អួតចុកពោះ និងជម្ងឺខាត់ល្បែង។	អាចមិនមានរោគសញ្ញាទេ។ អ្នកខ្លះអាចមានអាហាររោគដូចគ្រុនក្តៅសាយធំ ទឹកនោមមានពណ៌មិនប្រក្រតី លាមកពណ៌ខ្ចី ជម្ងឺខាត់ល្បែង ហត់អស់កម្លាំង និងគ្រុនក្តៅ។	ដូច HBV	ដូច HBV	ដូច HBV
វិធីព្យាបាលជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ	មិនមានវិធីព្យាបាលទេ។	ប្រើថ្នាំ Interferon និង Lamivudine វិធីព្យាបាលនេះ មានជោគជ័យប្លែកៗពីគ្នា។	ប្រើថ្នាំ Interferon ជំនុំជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងទៀតគ្នា។ មានជោគជ័យប្លែកៗពីគ្នា។	ប្រើថ្នាំ Interferon វិធីព្យាបាលនេះ មានជោគជ័យប្លែកៗពីគ្នា។	មិនមានវិធីព្យាបាលទេ។
ចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ	សំរាប់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពីពីរឆ្នាំឡើងទៅត្រូវចាក់ពីរដូល។	សំរាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ត្រូវចាក់បីដូល។	មិនមានថ្នាំចាក់ការពារទេ។	ការចាក់ថ្នាំការពារ HBV បង្ការមិនឱ្យមានជំងឺថ្លើម HDV ។	មិនមានថ្នាំចាក់ការពារទេ។
តើនរណាអាចមាន	វត្តប្រើប្រាស់ មនុស្សក្នុងផ្ទះ ឬការរួមភេទជា	ទារកកើតពីម្តាយដែលមានមេរោគនេះ ការរួម	អ្នកដែលបានបញ្ចូលឈាមមុន	អ្នកប្រើគ្រឿងញៀនដោយចាក់	អ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលកំ

<p>គ្រោះថ្នាក់ដោយសាររោគនេះ?</p>	<p>មួយអ្នកដែលមានរោគ ឬក៏រស់នៅតំបន់កំពុងតែកើតមានជម្ងឺ HAV ។ អ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ អ្នកដែលរួមភេទតាមមាត់ និងប្រើថ្នាំញៀនដោយចាក់នឹងម្តុល។</p>	<p>ភេទជាមួយអ្នកកើតរោគនេះ ឬមានគូរច្រើន អ្នកប្រើគ្រឿងញៀនដោយចាក់នឹងម្តុល អ្នកជួយសង្គ្រោះការអាសន្ន បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាព អ្នករួមភេទដោយប្រើមាត់ និងអ្នកជំងឺដែលប្រើម៉ាស៊ីនសំរាប់លាងឈាម។</p>	<p>ឆ្នាំ១៩៩២ បុគ្គលិកផ្នែកសុខភាព អ្នកប្រើគ្រឿងញៀនដោយចាក់នឹងម្តុល អ្នកជំងឺដែលប្រើម៉ាស៊ីនសំរាប់លាងឈាម ទារកកើតពីម្តាយដែលមានរោគនេះ ការរួមភេទជាមួយគូរច្រើន។</p>	<p>នឹងម្តុល អ្នករួមភេទដោយប្រើមាត់ និងអ្នករួមភេទជាមួយអ្នកមាន HDV ។</p>	<p>ពុំធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ។</p>
<p>ការបង្ការរោគ</p>	<p>ត្រូវប្រើថ្នាំ Immune Globulin ក្នុងរយៈពេល២អាទិត្យបន្ទាប់ពីបានប៉ះនឹងមេរោគនេះ។ ការចាក់ថ្នាំការពារ។ លាងដៃនឹងសាប៊ូនិងទឹកបន្ទាប់ពីប្រើបង្គន់ហើយ។ ប្រើទឹក bleach (ទឹក ១០ភាគលាយនឹង bleach មួយភាគ) ដើម្បីលាងសំអាតកន្លែងដែលប្រឡាក់នឹងលាមកដូចជាតុប្រក់កន្ទបក្នុងក្រុង។ ប្រើវិធីការពារនៅពេលរួមភេទ។</p>	<p>ត្រូវប្រើថ្នាំ Immune Globulin ក្នុងរយៈពេល២អាទិត្យបន្ទាប់ពីបានប៉ះនឹងមេរោគនេះ។ ការចាក់ថ្នាំការពារអាចជួយការពារបានដល់ទៅ ១៨ឆ្នាំ ឬក៏ច្រើនទៀត។ ប្រើទឹក bleach លាងកន្លែងដែលមានប្រឡាក់ឈាមមានមេរោគ និងពាក់ស្រោមដៃការពារ។ សូមកុំប្រើឡាម កោរ ច្រាសដុសធ្មេញ ឬម្តុលរួមគ្នា។ ប្រើវិធីការពារនៅពេលរួមភេទ។</p>	<p>ប្រើទឹក bleach លាងកន្លែងមានប្រឡាក់ឈាមដែលកំពប់។ ពាក់ស្រោមដៃការពារនៅពេលដែលប៉ះពាល់ឈាម។ សូមកុំប្រើឡាមកោរ ច្រាសដុសធ្មេញ ឬម្តុលរួមគ្នា។ ប្រើវិធីការពារនៅពេលរួមភេទ។</p>	<p>ចាក់ថ្នាំការពារដើម្បីបង្ការដំបៅរលាកដោយ HBV ។ ប្រើវិធីការពារនៅពេលរួមភេទ។</p>	<p>ជៀសវាងកុំទទួលបាន ឬប្រើទឹកដែលអាចមានមេរោគ។</p>