

ការណែនាំរបៀបរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើតេស្ត
COLONOSCOPY ដោយប្រើថ្នាំបញ្ជា៖ Fleets
Phosphosoda

ថ្ងៃណាត់ជួប : _____
 ម៉ោងណាត់ជួប : _____
 ទីកន្លែង : _____

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ៧ថ្ងៃមុន ការពិនិត្យ :

- រកអ្នកជូនដំណើរ : គ្រូពេទ្យនឹងដាក់ថ្នាំឱ្យលោកអ្នកសំរាក និងសម្លឹង ដូច្នោះអ្នកមិនអាចបើកឡាន ឬជិះឡានសាធារណៈទៅផ្ទះបានទេ ។ បើអ្នកមកមន្ទីរពិនិត្យដោយគ្មានអ្នកជូនទេ នោះ ការពិនិត្យរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវធ្វើការណាត់សាជាថ្មី ។
- ឈប់លេបថ្នាំជំនួយជាតិដែក (Iron) វីតាមីន E gingo ខ្លី ថ្នាំអាស៊ាន និងខ្លីមស ។
- បើអ្នកលេបថ្នាំ Coumadin ឬបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នកសំរាប់ការណែនាំពិសេស ។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ១ថ្ងៃមុន ពិនិត្យមើល :

- ចាប់ផ្តើមគំរោងទទួលទានតែអាហាររាវថ្ងា ។ បើអ្នកដាក់វត្ថុរាវក្នុងកែវថ្ងាមួយ ហើយអ្នកអាចមើលឃើញពន្លឺ នោះអ្នកអាចទទួលទានបាន ។ អាហាររាវថ្ងាមានដូចជា :
 - ទឹកប៉ោម ទឹកទំពាំងបាយជូស និងទឹក cranberry
 - ស៊ុបមាត់ និងស៊ុបគោដៃលថ្ងា
 - តែ និងកាហ្វេដោយមិនមានលាយទឹកដោះគោ ឬ ក្រែម
 - ទឹកស្អាត Gatorade Kool-Aid និងសារាយ Jell-o មានរសជាតិផ្សេងៗ (ពណ៌អ្វីក៏បានលើកលែងតែពណ៌ក្រហម)
- រៀសវាង : ទឹកខាប់ៗ ទឹកដោះគោ ក្រែម និងអាហាររឹង ។
- ម៉ោង 12:00 ថ្ងៃត្រង់ ទទួលទាន Fleets Phosphosoda ១អោស ជាមួយទឹកមួយកែវ ។ បន្ទាប់មក ទទួលទានទឹកផ្លែឈើថ្ងាមួយកែវ (ដូចជាទឹកផ្លែប៉ោម) ។
- ម៉ោង 6:00 ល្ងាច ទទួលទាន Fleets Phosphosoda ១អោស ជាមួយទឹកមួយកែវ ។ បន្ទាប់មក ទទួលទានទឹកផ្លែឈើថ្ងាមួយកែវ (ដូចជាទឹកផ្លែប៉ោម) ។
- ម៉ោង 8:00 ល្ងាច លេបថ្នាំ Bisacodyl ៣ក្រាប ជាមួយទឹក ៣កែវ ។ សូមបន្តទទួលទានអាហាររាវថ្ងាៗឱ្យបានច្រើនរហូតដល់ពេលចូលគេង។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ៣ថ្ងៃមុន ការពិនិត្យ :

- បញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ជាមួយអ្នកជូនដំណើររបស់អ្នក ។
- បើអ្នកត្រូវការលុបការណាត់ជួប សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការបស់អ្នក ។
- ពិនិត្យឡើងវិញនូវអាហារដែលត្រូវតមសំរាប់កំឡុងពេល ២ថ្ងៃក្រោយ ចូរគំរោងអាហាររបស់អ្នកតាមវិធីខាងក្រោមនេះ ។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ២ថ្ងៃមុន ពិនិត្យមើល :

- ទទួលទានទឹកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៨កែវក្នុងមួយថ្ងៃ ។
- ឈប់លេបថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺរលាក ដូចជាថ្នាំ : Nuprin, Bufferin, Anacin, Advil, Motrin, Indocin, Voltran, Aleve, Ecotrin, Relafen, Alka Seltzer, Naprosyn, Voltaren (Tylenol អាចលេបបាន) ។
- ឈប់ញ៉ាំអាហារគ្រាប់ ពោតលើង គ្រាប់សណ្តែក និងធញ្ញជាតិផ្សេងៗ ។
- ហាមទទួលទានអាហាររឹងបន្ទាប់ពីម៉ោង ១២យប់ ។

ធ្វើរបៀបទាំងនេះ នៅថ្ងៃ ពិនិត្យ :

- លេបថ្នាំដែលត្រូវលេបដូចធម្មតាជាមួយនឹងទឹកបន្តិច ។
- អ្នកអាចទទួលទានអាហាររាវរហូតដល់ ៣ម៉ោងមុនពេលពិនិត្យ ។
- នាំអ្នកជូនដំណើរ ឬអ្នកបើកឡានមកមន្ទីរពិនិត្យជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃណាត់ ។
- អ្នកត្រូវមកដល់មន្ទីរពិនិត្យរោគ ៣០នាទីមុនម៉ោងណាត់ ។