

**ការណែនាំរបៀបប្រើប្រាស់ថ្នាំ ដើម្បីធ្វើតេស្ត**  
**COLONOSCOPY ដោយប្រើថ្នាំបញ្ជុះ Golytely**

ថ្ងៃណាត់ជួប : \_\_\_\_\_  
 ម៉ោងណាត់ជួប : \_\_\_\_\_  
 ទីកន្លែង : \_\_\_\_\_

**ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ៧ថ្ងៃមុន ការពិនិត្យ :**

- **រកអ្នកជូនដំណើរ :** គ្រូពេទ្យនឹងដាក់ថ្នាំឱ្យលោកអ្នកសំរាក និងសម្ងំ ដូច្នោះអ្នកមិនអាចបើកឡាន ឬជិះឡានសាធារណៈទៅផ្ទះបានទេ ។ បើអ្នកមកមន្ទីរពិនិត្យដោយគ្មានអ្នកជូនទេ នោះ ការពិនិត្យរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវធ្វើការណាត់សាជាថ្មី ។
- ឈប់លេបថ្នាំជំនួយជាតិដែក (Iron) វីតាមីន E gingo ខ្លី ថ្នាំអាស្តារីន និងខ្លឹមស ។
- បើអ្នកលេបថ្នាំ Coumadin ឬបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការរបស់អ្នកសំរាប់ការណែនាំពិសេស ។

**ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ៣ថ្ងៃមុន ការពិនិត្យ :**

- បញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ជាមួយអ្នកជូនដំណើររបស់អ្នក ។
- បើអ្នកត្រូវការលុបការណាត់ជួប សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការរបស់អ្នក ។
- ពិនិត្យឡើងវិញនូវអាហារដែលត្រូវតមសំរាប់កំឡុងពេល ២ថ្ងៃក្រោយ ចូរគំរោងអាហាររបស់អ្នកតាមវិធីខាងក្រោមនេះ ។

**ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ២ថ្ងៃមុន ពិនិត្យមើល :**

- ទទួលទានទឹកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៨កែវក្នុងមួយថ្ងៃ ។
- ឈប់លេបថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺរលាក ដូចជាថ្នាំ : Nuprin, Bufferin, Anacin, Advil, Motrin, Indocin, Voltran, Aleve, Ecotrin, Relafen, Alka Seltzer, Naprosyn, Voltaren (Tylenol អាចលេបបាន) ។
- ឈប់ញ៉ាំអាហារគ្រាប់ ពោតលើង គ្រាប់សណ្តែក និងធញ្ញជាតិផ្សេងៗ ។
- ហាមទទួលទានអាហាររឹងបន្ទាប់ពីម៉ោង ១២យប់ ។

**ធ្វើរបៀបទាំងនេះ ១ថ្ងៃមុន ពិនិត្យមើល:**

- **ចាប់ផ្តើមគំរោងទទួលទានតែអាហាររាវថ្ងា ។** បើអ្នកដាក់វត្ថុរាវក្នុងកែវថ្នាំមួយ ហើយអ្នកអាចមើលឃើញផ្ទះ នោះអ្នកអាចទទួលទានបាន ។ អាហាររាវថ្ងាមានដូចជា :
  - ទឹកប៉ោម ទឹកទំពាំងបាយជូស និងទឹក cranberry
  - ស៊ុបមាត់ និងស៊ុបគោដៃលថ្ងា
  - តែ និងកាហ្វេដោយមិនមានលាយទឹកដោះគោ ឬ ក្រែម
  - ទឹកស្វដា Gatorade Kool-Aid និងសារាយ Jell-o មានរសជាតិផ្សេងៗ (ពណ៌អ្វីក៏បានលើកលែងតែពណ៌ក្រហម)
- **រៀសវាង :** ទឹកខាប់ៗ ទឹកដោះគោ ក្រែម និងអាហាររឹង ។
- ចាក់ទឹកឱ្យពេញចូលក្នុងកំប៉ុងផ្លាស្ទិកដែលមានម្សៅថ្នាំបញ្ជុះ (Golytely) ក្រឡកឱ្យបានសព្វហូតដល់ម្សៅរលាយអស់ ហើយដាក់កំប៉ុងនោះនៅក្នុងទូរទឹកកក។
- **ម៉ោង 1:30 ថ្ងៃរសៀល** លេបថ្នាំ Metoclopramide ១គ្រាប់ជាមួយទឹក ។ ថ្នាំនេះជួយអ្នកកុំឱ្យមូលពោះ ដែលបណ្តាលមកពីថ្នាំ Golytely ។
- **ម៉ោង 2:00 ថ្ងៃរសៀល** ចាប់ផ្តើមទទួលទានថ្នាំទឹកបញ្ជុះ (Golytely) ។ ទទួលទានម្តងមួយកែវពេញរាល់ ១៥នាទីរហូតទាល់តែអស់ ។ សូមប្រើប្រាស់ទទួលទានម្តងមួយកែវពេញប្រសើរជាងម្តងបន្តិច ។
- **ម៉ោង 5:00 ល្ងាច** លេបថ្នាំ Metoclopramide គ្រាប់ទី២ ជាមួយទឹក ។
- **បន្តទទួលទានវត្ថុរាវពេញមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែកុំញ៉ាំអាហាររឹងឱ្យសោះ ។**
- ទឹកថ្នាំបញ្ជុះ Golytely នឹងបណ្តាលឱ្យអ្នកបត់ដើងធំញឹកញាប់ ។ យើងត្រូវការបែបនេះ ដើម្បីឱ្យពោះវៀនរបស់អ្នកទំនេរស្អាតសំរាប់ការពិនិត្យ ។ បើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ចប់ការណែនាំនេះ សូមទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាយិការរបស់អ្នក ។



**ធ្វើរបៀបទាំងនេះ នៅថ្ងៃ ពិនិត្យ :**

- លេបថ្នាំដែលត្រូវលេបដូចធម្មតាជាមួយនឹងទឹកបន្តិច ។
- អ្នកអាចទទួលបានអាហាររាវរហូតដល់ ៣ម៉ោងមុនពេលពិនិត្យ ។
- នាំអ្នកជូនដំណើរ ឬអ្នកបើកឡានមកមន្ទីរពិនិត្យជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃណាត់ ។
- អ្នកត្រូវមកដល់មន្ទីរពិនិត្យរោគ ៣០នាទីមុនម៉ោងណាត់ ។

តើអ្នកមានសំណួរ ឬបញ្ហាអំពីការណែនាំនេះ ឬទេ ? សូមទូរស័ព្ទទៅ : \_\_\_\_\_ ។