

# ព័ត៌មានស្តីអំពីជម្ងឺមហារីកប្រស្តេត (Prostate Cancer)

## តើជម្ងឺមហារីកប្រស្តេតគឺជាអ្វី?

ប្រស្តេតមានទំហំប៉ុនផ្លែឃ្នុក (walnut) មានតែបុរសទេដែលមាន។ ហើយវានៅខាងក្រោមតម្រងនោម និងខាងមុខចុងពោះរៀនធំ។ បុរសជនជាតិអាស៊ី និងបុរសមកពីកោះនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើន តែងតែកើតជម្ងឺមហារីកប្រស្តេត។ មានការពិនិត្យធ្វើតែស្តម្ភយចំនួន ដែលអាចជួយឱ្យរកឃើញជម្ងឺមហារីកប្រស្តេត នៅពេលដែលវាទើបតែកើតមានថ្មីៗ។ ប៉ុន្តែយើងក៏មិនបានដឹងឱ្យពិតប្រាកដថា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញជម្ងឺនៅពេលដែលវាទើបតែចាប់ផ្តើមកើតមាន អាចជួយបង្កើននូវអត្រាឱ្យរួចផុតពីការស្លាប់ដោយសារជម្ងឺនេះទេ។ អំពីសេចក្តីសំរេចចិត្ត ក្នុងការធ្វើតែស្តម្ភពិនិត្យជម្ងឺនេះ វាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ និងគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក។

## តើនរណាខ្លះ អាចរងគ្រោះដោយសារជម្ងឺនេះ?

- បុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុច្រើនជាង ៥០ឆ្នាំ
- បុរសដែលទទួលបានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើន
- បុរសដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតជម្ងឺមហារីកប្រស្តេត

## ការណែនាំសំរាប់ការពិនិត្យ:

- នៅពេលដែលលោកអ្នកមានអាយុ ៥០ឆ្នាំ ចូរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នកអំពីការយកឈាមពីប្រស្តេតទៅពិនិត្យ និងការពិនិត្យប្រស្តេតដោយប្រើឌីជីថាល់ (Digital) ស៊ីកចូលតាមចុងពោះរៀនធំ។
- កត្តាដែលគួរយកមកវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីសម្រេចកំណត់ការពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំមាន : សុខភាពរបស់លោកអ្នកទូទៅមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ និងអាយុកាលមធ្យម។
- បុរសដែលយល់ថា ខ្លួនអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជម្ងឺនេះ (ដូចជាមានញាតិសន្តានធ្លាប់កើតជម្ងឺមហារីកប្រស្តេត) ត្រូវពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នកអំពីការធ្វើតែស្តម្ភបែបនេះ ឱ្យបានឆាប់។

## រោគសញ្ញានិងអាការរោគ

- ជម្ងឺមហារីកប្រស្តេតនេះ ភាគច្រើន មិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទេនៅពេលដែលទើបតែកើតមានថ្មីៗ។ នៅពេលដែលបុរសមានអាយុកាន់តែច្រើន ប្រស្តេតរបស់ពួកគេច្រើនតែរីកធំ ដែលមិនមែនជាជម្ងឺមហារីក។ ទោះជាដូច្នោះក្តី បុរសណាមានអាការរោគអ្វីមួយដូចដែលបានរាយនៅខាងក្រោមនេះ ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ដើម្បីពិនិត្យឱ្យដឹងច្បាស់ថា តើនោះបណ្តាលមក ពីជម្ងឺមហារីកប្រស្តេតឬទេ?

- បទជើងតូចញឹកញាប់ ជាពិសេសនៅពេលយប់
- មានការលំបាកក្នុងការចាប់ផ្តើមបត់ជើងតូច ឬទ្រាំទប់បត់ជើងតូច
- នៅពេលបត់ជើងតូច ទឹកនោមហូរចេញរអាក់រអួល
- មានការឈឺផ្សារនៅពេលបត់ជើងតូច ឬនៅពេលបញ្ចេញទឹកកាម
- មានឈាមលាយក្នុងទឹកនោម ឬទឹកកាម
- ឈឺ ឬមានភាពចុករោយនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្នង ចង្កេះ ឬភ្នៅខាងលើ

**អំពីការធ្វើតេស្តពិនិត្យជម្ងឺមហារីកប្រស្តេត**

ការយកឈាមទៅពិនិត្យសារធាតុ PSA (Prostate-specific Antigen) - PSA ជាសារធាតុម្យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនយើងជួយការពារនិងទប់ទល់រោគាផ្សេងៗ

- គ្រូពេទ្យនឹងប្តូរឈាមយកទៅវាស់មើលកំរិតសារធាតុ PSA
- កំរិតសារធាតុ PSA ល្អធម្មតាគឺ ត្រឹម 4.0 ng/ml. ឬក៏តិចជាងនេះ។
- បើកំរិតសារធាតុ PSA របស់លោកកើនច្រើនជាងកំរិតធម្មតាបន្តិចបន្តួច វាមិនមែនមានន័យថាលោកមានជម្ងឺមហារីកប្រស្តេតទេ វាអាចមានហេតុភេទផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឱ្យកំរិត PSA របស់លោកកើនឡើងខ្ពស់ជាង 4.0។ គ្រូពេទ្យរបស់លោកអាចណែនាំឱ្យលោកធ្វើតេស្តម្តងទៀត ដើម្បីពិនិត្យឱ្យដឹងច្បាស់ថាកំរិតវានៅតែខ្ពស់ជាងធម្មតា។ គ្រូពេទ្យអាចណែនាំឱ្យធ្វើតេស្តផ្សេងថែមទៀត ដើម្បីពិនិត្យមើលខ្លាចមានជម្ងឺមហារីក។

ការពិនិត្យតាមចុងពោះរៀនធំដោយប្រើដីហ្សឺតាល់ (Digital Rectal Exam – DRE)

- នៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការពិនិត្យនេះ គ្រូពេទ្យនឹងសឹកម្រាមដៃដែលបានពាក់ស្រោមនិងលាបប្រេងចូលតាមចុងពោះរៀនធំ ដើម្បីស្ទាបប្រស្តេតរកមើលកន្លែងដែលរឹងខុសពីប្រក្រតី ដែលអាចជាជម្ងឺមហារីក។ ប្រស្តេតនៅជិតចុងពោះរៀនធំ ហើយជម្ងឺមហារីកភាគច្រើន ចាប់ផ្តើមកើតពីកន្លែងនេះ ដែលធ្វើឱ្យយើងអាចពិនិត្យបានដោយប្រើវិធីពិនិត្យបែបនេះ។
- ការធ្វើតេស្តបែប DRE មានប្រសិទ្ធភាពច្រើននៅពេលប្រើរួមជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តបែប PSA ។

ការធ្វើតេស្តបែបផ្សេងៗទៀត:

- ការឆ្លុះពិនិត្យតាមចុងពោះរៀនធំដោយប្រើអ៊ុលត្រាសោន : គ្រូពេទ្យនឹងសឹកបំពង់ដ៏ស្តើងតូចមួយចូលទៅតាមចុងពោះរៀនធំ ដែលមានគ្រឿងបញ្ជូនភ្ជាប់នៅចុងម្ខាងទៀត ហើយ

ធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលប្រស្តុតពីក្នុងចុងពោះរៀនធំ។ វិធីនេះ ជួយធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យមើលឃើញ  
អ្វីៗ ដែលខុសពីប្រក្រតី ដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងសរីរាង្គនេះ។

**ឯកសារជំនួយ:**

- ❖ Cancer Information Service (800) 4-CANCER, ជាកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកជម្ងឺមហារីក  
<http://cancernet.nci.nih.gov>
- ❖ American Cancer Society (800) ACS-2345