

ለሳንባ ነቀርሳ

ሕክምና

የሚወሰዱ መድሐኒቶች

ISONIAZID(አይሶናይዝል)

RIFAMPIN(ሪፋምፒን)

RIFAMATE(ሪፋማት)

PYRAZINAMIDE(ፓይራሲናሚል)

ETHAMBUTOL(ኢታምቢቶል)

የሕመምተኛ ስም

መድሐኒት መውሰድ የሚጀመርበት ቀን

Amharic...

SEATTLE-KING COUNTY
DEPARTMENT OF PUBLIC
HEALTH
TUBERCULOSIS CONTROL
PROGRAM
1207 PUBLIC SAFETY BLDG.
SEATTLE, WA 98104
(206) 296-4747
3/95

ISONIAZID (INH) አየሰናዝድ (አይ ኤን ኤች)

ይህንን መድከኒት እየወሰዱ እያሉ ሊመለከቱ የሚገባዎት ሊመጣ የሚችል ተጨማሪ ችግር መደንገዝ መሳሌ (ሰሜት ማጣት) የእጅ ወይም የእግር ጣት መደንገዝ ያመጣል።

ሊረከብዎት ወይም ለነርሶዎት (ለአስታሚን) ወዲያውኑ መንገር አለብዎት። የሚከተሉት መድከኒቶች መውሰድ ጅምረው ከሆነ ISONIAZID (አይሰናዝድን) እየወሰዱ እያሉ:-

- Antabuse (አንታብሱ) የሚያሰክር መጠጥ (አልኮል) መጠጣት ለማቆም የሚረዳ የሚወሰድ መድከኒት
- Dilantin (ዳይላንቲን) ለአዙሪት ወይም የሚጥል በሽታ ያለው ሰው የሚሰጥ መድከኒት

RIFAMPIN (ሪፋምፒን)

ይህንን መድከኒት እየወሰዱ እያሉ ሊመለከቱ የሚገባዎት ሊመጣ የሚችል ተጨማሪ ችግር:-
-በተለይ ቆይታ ለተገኘ ወይም ሲጠቀስ በተለይ ሲበልጥ
-የእጅ ወይም የእግር ጣቶች ሲደንገዙ ሲዘሉ (ሰሜት ሲያጡ)
-የወር አበባ በሚመጣበት ጊዜ የሆድ ቁርጠት ወይም ሆድ ለሆድ ሲጨምር

Rifampin (ሪፋምፒን) የሽንት ወትንቱ የላብዎትን የምራቅ ወትንቱ የሰገራዎትን ቀለም ቀይ ወይም ብርቱካን መልክ ይሰጠዋል ይህንን መድከኒት እየወሰዱ እያሉ። ይህ የተለመደ ነውና አይጎዳዎትም ነገር ግን በዓይን መነጻር ፋንታ አይን ላይ የሚገባ ኮንታክት ሌንስ (contact lenses) የሚባል የሚጠቀሙ ከሆነ ምን አልባት ብርቱካንማ ቀለም ይህ ሊቀር ይችላል።

- ሐኪምዎን ወይም ነርሶዎን (አስታሚን) ወዲያውኑ መንገር አለብዎት። የሚከተሉትን መድከኒቶች መውሰድ ጅምረው ከሆነ Rifampin (ሪፋምፒን) እየወሰዱ እያሉ:-
- የወሊድ መቆጣጠሪያ መድከኒት ከኒንቱ በመርፈ የሚሰጠውን ወይም በቶዳ ውስጥ የሚጠቀሙበት -ዕጽ (አሽሽ) ለማቆም የሚረዳ መድከኒት እየወሰዱ ከሆነ
- የልብ የደምት የሰካር በሽታ መድከኒቶች
- ስቴሮይድስ (steroids) ወይም ሌላ መድከኒቶች ለማስታገስ የሚረዳዎት እየወሰዱ ከሆነ
- Theophylline (ቲዮፊሊን) ለማንኛውም የላንባ በሽታ

RIFAMATE (ሪፋማት)

ይህ መድከኒት ከሁለት መድከኒቶች ተቀላቅሎ ባንድ ከኒኒ ውስጥ 150 ሚሊግራም isoniazid (አይሰናዝድ) እና ከ 300 ሚሊግራም rifampin (ሪፋምፒን) የተወሰዱ ነው።

ተጨማሪ የሆነ ችግር rifamate (ሪፋማትን) እየወሰዱ እያሉ ሊያስተውሉ የሚያስፈልገው ምልክቶች:-

- የእጅ ወይም የእግር ጣቶች ሊዘሉ ሰሜት ሲያጣ ወይም ሲዘሉ
- በተለይ ቆይታ ሲበልጥ
- የወር አበባዎት በመጣ ጊዜ የሆድ ቁርጠቱ ሲጨምር (ሲብስ)

Rifamate (ሪፋማት) የሽንት ወትንቱ የላብዎትን የምራቅ ወትንቱ የሰገራዎትን እና የሠገራዎትን ቀለም ቀይ ወይም ብርቱካንም ያደርገዋል። ይህ የተለመደ ነውና ምንም ሌላ ችግር አያመጣም። ነገር ግን በመነጻር ፋንታ አይን ውስጥ የሚደረግ በዓይን መነጻር ፋንታ አይን ላይ የሚገባ ኮንታክት ሌንስ (contact lenses) የሚባል የሚጠቀሙ ከሆነ ምን አልባት ብርቱካንማ ቀለም ይህ ይቀር ይሆናል።

የሚከተሉትን መድከኒቶች መውሰድ ጅምረው ከሆነ ይህንን Rifamate (ሪፋማት) እየወሰዱ እያሉ ሐኪምዎን ወይም አስታሚንዎን ወዲያውኑ ያስታውቁ።

- Antabuse (አንታብሱ) የሚያሰክር መጠጥ ላለመውሰድ የሚረዳ መድከኒት
- Dilantin (ዳይላንቲን) ለአዙሪት ወይም ለሚጥል በሽታ የሚወሰድ መድከኒት
- የወሊድ መቆጣጠሪያ መድከኒት በኒኒኒ በመርፈ ወይም በሰውነት ውስጥ የሚሰጥ መድከኒት
- ዕጽ (አሽሽ) ላለመውሰድ የሚረዳ መድከኒት
- Theophylline (ቲዮፊሊን) ለማንኛውም የላንባ በሽታ
- የልብ የደምት የሰካር በሽታ መድከኒቶች እንደ ስቴሮይድስ (steroids) የመሳሰሉ በሽታውን ለማስታገስ የሚወሰድ መድከኒት

PYRAZINAMIDE(PZA)

ፓይራሲናሚድ (ፒዜኤ)

ሊያመጣ የሚችለው ተጨማሪ ችግር ማየት ያለበው ነገር

-የሰውነትን መግባጠሚያ ሲይምዎት ወይም

ሲያበጥ

-የሽንት መሸናት ችግር ሲሆን

PZA(ፒዜኤ)ን ከሌላ መድኃኒት ጋር በወሰዱት ችግር የለውም

ETHAMBUTOL(ኢታምቡቶል)

ተጨማሪ የሆነ ችግር ሊመጣ የሚችለው ይህንን መድኃኒት እየወሰዱ እያሉ ማየት ያለበው ነገር፡-

-የማየት ችግር አጥርቶ (ሲደበዘዝ)

-የማንበብ ችግር

-ቀይ እና አረንጓዴን ቀለም ለማየት(ለመለየት)

ሲቸገሩ

-መግባጠሚያዎት ሲያምዎት ወይም ሲያበጥ

Ethambutol(ኢታምቡቶል) የማየት ችግር ሊያመጣ ይችላል ይህንን መድኃኒት ከመውሰድዎት በፊትና እየወሰዱ እያሉ ቀላል የሆነ የአይን ህክምና ይደረግልዎታል በተለመደው የጤና ህክምና ቀጠርዎት ጊዜ ይህ ይደረጋል።

ይህንን መድኃኒት ከሌላ መድኃኒት ጋር በወሰዱ ችግር አያመጣም

ለሳንባ ነቀርሳ የታዘዘልዎት መድኃኒቶች እንደሚከተሉት ነው፡-

Isoniazid(አይስናይዝድ) _____ ሚሊግራም _____ ከኒፕቸ/በቀን

Rifampin(ሪፋምፒን) _____ ሚሊግራም _____ ከኒፕቸ/በቀን

Rifamate(ሪፋማት) _____ ሚሊግራም _____ ከኒፕቸ/በቀን

Pyrazinamide(ፓይራሲናሚድ) _____ ሚሊግራም _____

ከኒፕቸ/በቀን

Ethambutol(ኢታምቡቶል) _____ ሚሊግራም _____ ከኒፕቸ/በቀን

ሕመም ባይለማውትም እንኳን ለሳንባ ነቀርሳ የታዘዘልዎትን መድኃኒት ሁሉ መጨረስ በጣም አስፈላጊ ነው

ለማንኛውም የሚከተሉት የሕመም ስሜት ከተሰማዎት ለሐኪምዎት ተሳታፊነት ወይንም ለሕክምና ጣቢያዎት ይደውሉ።

የሚከተሉት የሕመም ስሜትዎች ካለዎት ገና ለሚቀጥለው ቀጠር ጊዜ አትጠብቁ ወዲያው ይደውሉ።

-ቶኔዎት ወይም አይንዎት በጫ ከሆነ

-ሰውነትዎት ሲበላውና ሽፍ ሊ

-ሲያትለሸልሸዎት ወይም ሲያስታውቁዎት

-ሽንትዎት ሲጠቀር ለገራዎት ሲነጣ ከተለመደው መልኩ ሲቀየር

-ትኩሳት ሲኖርዎት በጣም ሐይለኛ ደካም ሲለማዎት - ሰውነትዎት በጣም ሲዘል

-ከታዘዘልዎት መድኃኒት አጥፍ አድርገው አትወሰዱ

-ለማንም ሰው መድኃኒትዎትን እንዲወሰድ አትስጡ

-መድኃኒቶችን ልጆች ለደርሱበት በማይችሉት ሥፍራ አስተምጡ

-አዲስ መድኃኒት መውሰድ ከጀመሩ

-የሚያለከር መጠጥ እንደ በ.ራ የመሳሰሉ በየቀኑ መጠጣት ከጀመሩ

-ካረዘዙ

-አዲስ አይነት ሳይ ከጀመረዎት ትኩሳይ ወይም ከብደት ከቀነሱ

እነዚህ ነገሮች ከሆኑ ለሐኪምዎት ወይም ለነርሶዎት ደውሉ