


Ung Thư Tuyến Tiền Liệt



Tuyến tiền liệt là tuyến nằm ở bên dưới bàng quang của nam giới và là nơi tiết ra tinh dịch.

Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ ba do ung thư nơi nam giới thuộc mọi lứa tuổi.

Bệnh này rất hiếm xảy ra ở nam giới dưới 40 tuổi.

Mức độ của một chất được tìm thấy trong máu được gọi là kháng nguyên của tuyến tiền liệt (PSA) thường ở mức cao nơi những người bị ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cũng có thể có PSA cao vì những tình trạng khác của tuyến tiền liệt, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc tuyến tiền liệt bị to.

Các khoa học gia đang không ngừng nghiên cứu thêm về việc truy tìm bệnh ung thư tuyến tiền liệt.


Hãy hỏi bác sĩ của quý vị về khi nào và loại thử nghiệm nào cho ung thư tuyến tiền liệt, kể cả thử nghiệm PSA, thích hợp cho quý vị.

Vì thử nghiệm PSA đã trở thành phổ biến, nên hầu hết các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt đều đã được phát hiện trước khi có triệu chứng.



Có rất nhiều triệu chứng của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Nếu quý vị có các triệu chứng sau đây, hãy gặp bác sĩ của quý vị

- Bị vấn đề khi đi tiểu, thí dụ như bị đau, khó bắt đầu tiểu hoặc ngừng tiểu, hay tiểu són
- Đau lưng dưới
- Bị đau khi xuất tinh



Phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt thường tùy thuộc vào giai đoạn của ung thư. Mức tăng trưởng của ung thư và sự khác biệt so với vùng mô chung quanh giúp xác định giai đoạn của bệnh.

- Phương pháp điều trị có thể bao gồm giải phẫu, xạ trị, hóa trị hoặc kèm chế kích thích tố có ảnh hưởng đến ung thư.



A project by Health Roads Media and EthnoMed
This project has been funded in whole or in part with Federal funds from the Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Library of Medicine, under Contract No. HHS-N-276-2011-0008-C with the University of Washington. Thank you to Safeway Foundation for its support to Harborview Medical Center's EthnoMed for the development of cancer-related content.