



Pertussis (Whooping Cough)

- यो के हो?**
 - ✓ Pertussis (“whooping cough”) एक अत्याधिक संक्रात्मक जिवाणु संक्रमण हो जसले गम्भिर रूपमा खोकी लगाउँछ ।
- लक्षणहरू**
 - ✓ लक्षण संक्रमित व्यक्तिसंग भेट भएको 6 देखी 21 (औसत 7-10 दिन) दिन पछि देखिन थाल्छ ।
 - ✓ Pertussis चिसो लक्षण वा सुक्का खोकी सहित पटक पटकको गम्भिर खोकी देखी सुरु हुनसक्छ । केहि गम्भिर खोकी पछि ग्यागिङ्ग वा उल्टि पनि हुनसक्छ । रातमा खोकी बढी गम्भिर पनि हुनसक्छ । खोकीको अन्तरालमा व्यक्ति स्वस्थ देखिन सक्छ वा उसले स्वस्थ रहेको महसुस गर्न सक्छ । ज्वरो नआउन पनि सक्छ वा हल्का आउनपनि सक्छ ।
 - ✓ खोप लगाएका स्कुले केटाकेटीहरू, किशोरकिशोरीहरू, र वयस्कहरू धेरैजसो जवान बच्चाहरू भन्दा कम बिरामी हुन्छन् ।
 - ✓ Pertussis सहितका नाबालकलाई गम्भिर खोकी नलाग्नसक्छ । तिनिहरूलाई सामान्य खोकी लाग्न सक्छ, स्तनपान कम गर्नसक्छन् र सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ वा निलो देखिन सक्छन् ।
- यो कसरी फैलिन्छ?**
 - ✓ Pertussis भएको व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छुँ गर्दा वा कुरागर्दा मुख र नाकबाट आउने छिँटाबाट फैलिन्छ ।
 - ✓ उपचार नगरिएको व्यक्तिले pertussis को संक्रमण धेरै हप्तासम्म फैलाउन सक्छन् ।
 - ✓ पहिचान नगरिएको pertussis संग संक्रमित भएका वयस्क, ठुला केटाकेटीहरू र स्वास्थ्य हेरचाह कामदारहरूले साना केटाकेटीहरू र गर्भवति महिला सहित अरु व्यक्तिहरूलाई पनि संक्रमित गराउन सक्छन् ।
- यो कसले प्राप्त गर्छ?**
 - ✓ जिवाणुको सम्पर्कमा आउने कुनै पनि व्यक्तिलाई pertussis लाग्नसक्छ ।
 - ✓ नवजात शिशुमा Pertussis को खोपले गम्भिर रोग लाग्नबाट रोकथाम गर्छ तर खोप लगाएका व्यक्तिलाई पनि pertussis लाग्नसक्छ ।
 - ✓ Pertussis ठुला केटाकेटीहरू र बयस्कमा देखिन सक्छ किनभने (DTP, DTaP) खोप बाट हुने रक्षा 100% हुँदैन र समय अनुसार घट्दैजान्छ ।
- सबैभन्दा बढी जोखीममा को छन्?**
 - ✓ एक बर्ष भन्दा कम उमेरमा शिशुहरूमा अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्ने, निमोनिया, कनभल्सन (एठन) र कहिलेकाँही ब्रेन ड्यामेज र मृत्यु सहित गम्भिर pertussis को उच्च जोखिम हुन्छ ।
 - ✓ खोप नलगाईएका वा आंशित रूपमा खोप लगाईएका केटाकेटीहरू पनि pertussis संक्रमण र गम्भिर रोगको उच्च जोखीममा हुन्छन् ।
 - ✓ Pertussis सहितको गर्भवति महिलाले डेलिभरि नजिकको समयमा नयाँ जन्मेको बच्चलाई पनि सार्न सक्छन् ।
- उपचार**
 - ✓ रोगको सुरुवातमा, pertussis विरुद्धको एन्टिबायोटीकले अन्य व्यक्तिहरूमा सर्नसक्ने सम्भावनालाई कम गर्नसक्छ ।
 - ✓ एन्टिबायोटीक सहित उपचार गरिएका व्यक्तिहरू पाँच दिनको उचित एन्टिबायोटीक उपचार पुरा भएपछि संक्रामक हुँदैनन् ।
- रोकथाम**
 - ✓ Pertussis विरुद्ध पुर्ण रूपमा खोप लगाउनुहोस् ।
 - केटाकेटीहरूले 7 वर्षको उमेर भन्दा अगाडी DTaP खोपको 5 डोज लगाउनुपर्छ ।
 - निम्न व्यक्तिहरूले DTaP खोपको एक डोज लगाउनुपर्छ:
 - 7-10 वर्षका केटाकेटीहरू जसले pertussis विरुद्धमा पुर्णरूपमा खोप लगाएका हुँदैनन् ।
 - किशोरकिशोरीहरू 11-18 वर्षका किशोरकिशोरीहरू जसले DTP/DTaP पुरा गरेका हुन्छन् ।
 - गर्भवति र प्रसोत्तर महिला, विशेषतः तेस्रो वा दोस्रो ट्राईमेस्टरको अन्तयमा, गर्भावस्थाको 20 हप्तापछि ।
 - 19 वा सो भन्दा बढी उमेरका सम्पुर्ण वयस्कहरू, विशेषरूपमा वयस्कहरू जो 12 महिना भन्दा कम उमेरको शिशुसंग सम्पर्कमा आएका छन् वा आउन सक्नेछन् ।
 - शिशुको घरपरिवारका सदस्य वा अन्य नजिकका व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
 - ✓ यदि तपाईंलाई खोकी लागि रहेको छ भने शिशुसंग र गर्भवती आमासंग सम्पर्क नराख्नुहोस् । अस्पताल लेबर, डेलिभरी र नर्सरी क्षेत्रहरूमा नघुम्नुहोस् वा काम नगर्नुहोस् र बाल हेरचाह सेटीङ्गमा नघुम्नुहोस् वा काम नगर्नुहोस् ।
 - ✓ यदि तपाईं pertussis भएको व्यक्तिसंग बस्नुहुन्छ वा नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई pertussis को रोकथाम गर्न एन्टिबायोटीक चाहिनसक्छ- तपाईंको स्वास्थ्य हेरचाह प्रदातासंग सम्पर्क गर्नुहोस् ।

वैकल्पिक फर्म्याटमा पनि उपलब्ध छ ।

सम्पुर्ण King County कंसहरू मा फोन गरि Public Health मा रिपोर्ट गर्नुहोस् ।