


ព័ត៌មានស្តីអំពីជម្ងឺ មហារីកដោះ

តើជម្ងឺ មហារីកដោះជាអ្វី? ជម្ងឺ មហារីកដោះចាប់ផ្តើម កកើតនៅក្នុង ជាលិការបស់ដោះ។ វាគឺជាការលូតលាស់ធំហួស ប្រមាណនិងខុសពី ប្រក្រតីរបស់កោសិកាដោះ (ហើយយើងក៏បានដឹងថា វាជាសាច់ដុះនៅក្នុង ដោះដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់)។ នៅក្នុងដោះមានក្រពេញមួយចំនួន ហៅថា ឡូប (lobes មានរាងសំប៉ែត) ដែលធ្វើឲ្យមានទឹកដោះ ហើយ ចេញទឹកដោះបន្ទាប់ពីពេលដែលស្ត្រីទើបតែមានទារក។ បំពង់ដែលតភ្ជាប់ ក្រពេញទឹកដោះទៅនឹងចុងដោះ ដែលជា កន្លែងទឹកដោះចេញនោះ ហៅ ថាបំពង់ទឹកដោះ (duct)។ ដោះគឺកើតមកពីក្រពេញទឹកដោះ បំពង់ទឹក ដោះ និងជាលិកាដែលតភ្ជាប់និងមានជាតិខ្លាញ់។ ជម្ងឺ មហារីកដោះ អាចកើតមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងដោះ។



ធាតុពិតនៃជម្ងឺមហារីកដោះ :

- ❖ អត្រានៃជម្ងឺមហារីកដោះ កើនជាលំដាប់ក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំង។
- ❖ ចំពោះស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតពីអាស៊ី និងពីកោះនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក អត្រានៃជម្ងឺមហារីកដោះដែលរាលដាល បានកើនឡើងដល់ទៅ ១៥ភាគរយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៨៨ និងឆ្នាំ១៩៩៧។
- ❖ រវាងការពិនិត្យឃើញជម្ងឺមហារីកដោះក្នុងចំណោមស្ត្រីអាស៊ីអាមេរិកាំង និងស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកស ឃើញថា សភាពជម្ងឺរបស់ស្ត្រីអាស៊ីអាមេរិកាំងច្រើនតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកស។
- ❖ អត្រាដែលអាចមានជីវិតគង់នៅ(បន្ទាប់ពីមានជម្ងឺ មហារីកដោះ) ក្នុងចំណោមស្ត្រីអាស៊ីអាមេរិកាំង បន្ទាប់ពី បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយ ឃើញថា ទាបជាងអត្រារបស់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកស។
- ❖ ជម្ងឺមហារីកដោះអាចព្យាបាលបានដោយជោគជ័យ ប្រសិនបើឃើញជម្ងឺទាន់ពេល។
- ❖ ជម្ងឺមហារីកដោះច្រើនតែកើតមានឡើងក្នុងចំពោះស្ត្រីជនជាតិចិន ហ្វីលីពីន ហាវ៉ៃ ជប៉ុន និងកូរ៉េ។ ប៉ុន្តែ អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ត្រីជនជាតិអាស៊ីគ្រប់រូប។
- ❖ នៅពេលដែលយើងរកឃើញជម្ងឺមហារីកដោះក្នុងដំណាក់កាលដែលជម្ងឺទើបតែកើត អត្រាដែលអាចមានជីវិតគង់ នៅក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំដំបូងមានកម្រិតខ្ពស់ (ប្រហែល ៩៧%)។ បើរកឃើញជម្ងឺនៅដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរជាង នេះ គឺបន្ទាប់ពីជម្ងឺបានរាលដាលទៅសរីរាង្គផ្សេងៗ អត្រាដែលអាចមានជីវិតគង់នៅមានកម្រិតចុះថយយ៉ាង ខ្លាំង។

តើនរណាខ្លះអាចរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជម្ងឺនេះ?

- ❖ គ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានឡើងចំពោះស្ត្រីគ្រប់រូប សូម្បីតែស្ត្រីអាស៊ី ហើយជាពិសេស គឺស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនជាង ៥០ឆ្នាំ។

- ❖ ស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់កើតជម្ងឺមហារីកដោះដូចជា៖ ម្តាយ ឬបងប្អូនស្រី។
- ❖ ស្ត្រីដែលមានប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនធ្លាប់បានកើតជម្ងឺ មហារីកដោះ ប្រភេទដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់។
- ❖ ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះលើកទីមួយនៅពេលដែលមានអាយុច្រើន (៣០) ឬមិនដែលមានផ្ទៃពោះសោះ។
- ❖ ស្ត្រីដែលធ្លាប់ចាប់ផ្តើមមានរដូវ ឬមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអស់រដូវ
- ❖ ស្ត្រីដែលចូលចិត្តទទួលទានសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើន ឬស្ត្រីដែលលើសទម្ងន់ (ធាត់)។

រោគសញ្ញានិងអាការរោគ

ជម្ងឺមហារីកដោះអាចមិនមានរោគសញ្ញាទេនៅពេលដែលជម្ងឺទើបតែចាប់ផ្តើមកើត ហេតុដូច្នេះ ការឱ្យពេទ្យពិនិត្យដោះ ឱ្យបានទៀងទាត់ ជាការសំខាន់ណាស់ ទោះបីអ្នកមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយ (ព្រោះថា អ្នកអាចមានកើតជម្ងឺនោះ)៖

- ❖ ជុំសាច់ ឬសាច់ដុះនៅក្នុងដោះ ឬនៅម្តុំភ្លៀក
- ❖ ដោះមានការផ្លាស់ប្តូរទំហំ ទ្រង់ទ្រាយ និងពណ៌សម្បុរ
- ❖ ចុងដោះចេញទឹក
- ❖ នៅពេលដែលស្នាបស្បែកដែលស្រោបដោះ ឃើញថា មានការផ្លាស់ប្តូរ (ស្បែកអាចខូចចូល ឬខូចចេញ ឬបែកស្រកា)

ការណែនាំសំរាប់ការពិនិត្យដោះ :

ស្ត្រីគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះជាចាំបាច់ ដើម្បីពិនិត្យរកជម្ងឺមហារីកឱ្យឃើញទាន់ពេល ព្រោះថា ជម្ងឺមហារីកដោះមិនបង្ហាញនូវរោគសញ្ញាទេពេលដែលទើបតែចាប់ផ្តើម។ ការណែនាំ មានដូចតទៅ៖

- ❖ ស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនជាង៤០ឆ្នាំ ត្រូវតែឱ្យគ្រូពេទ្យថតដោះ និងពិនិត្យដោះបែបស៊ីប៊ីអ៊ី (CBE) ឱ្យបានរៀងរាល់ឆ្នាំ។
- ❖ ស្ត្រីដែលមានអាយុពី២០ឆ្នាំ ទៅ៣៩ឆ្នាំ ត្រូវឱ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យដោះបីឆ្នាំម្តង។
- ❖ ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលមានអាយុច្រើនជាង២០ឆ្នាំ ត្រូវពិនិត្យដោះដោយខ្លួនឯងឱ្យបានរៀងរាល់ខែ។

អំពីការពិនិត្យ : www.cancernet.org

ការពិនិត្យដោះដោយខ្លួនឯង (Breast Self Exam -BSE)- ការពិនិត្យដោះរបស់ខ្លួនឯង រហូតមកដល់ពេលនេះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការពិនិត្យដោះដោយខ្លួនឯង បានកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជម្ងឺមហារីកដោះ។ ទោះជាដូច្នោះក្តី យើងមិនអាចធ្វើការពិនិត្យដោះដោយខ្លួនឯងនេះ ជំនួសការពិនិត្យដោះដោយគ្រូពេទ្យ និងការថតដោះបានទេ។

ការពិនិត្យដោះដោយគ្រូពេទ្យ (Clinical Breast Exam – CBE) - នៅពេលលោកអ្នកទៅពិនិត្យរាងកាយតាមធម្មតា គ្រូពេទ្យ ឬបុគ្គលិកពេទ្យអាចពិនិត្យដោះជូនអ្នកបាន ហើយការពិនិត្យបែបនេះ ហៅថាស៊ីប៊ីអ៊ី (CBE)។ នៅពេល



ពិនិត្យបែបស៊ីប៊ីអ៊ី ត្រូវពេទ្យនឹងស្នាបដោះ និងម្តុំភ្ញៀវរបស់អ្នកដោយការប្រយ័ត្ន ដើម្បីពិនិត្យរកដុំសាច់ ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ។

ការថតដោះ (Mammogram) - គឺជាការថតដោះដោយប្រើកាំរស្មីអ៊ិក្ស ដែលភាគច្រើនអាចរកឃើញសាច់ដុះដ៏តូចបំផុត ដែលខ្លួនអ្នក ឬត្រូវពេទ្យរបស់អ្នកមិនអាចស្នាបដឹង។ ក្នុងពេលពិនិត្យបែបនេះ ដោះត្រូវសង្កត់ឱ្យសំប៉ែត ដើម្បីញែកជាលិកាឱ្យបែកចេញពីគ្នា និងដើម្បីប្រើកាំរស្មីអ៊ិក្សកម្រិតតិចបំផុត។ ថ្វីត្បិតតែការធ្វើបែបនេះ នាំឱ្យពិបាកបន្តិចមែន តែវាជាការចាំបាច់ដើម្បីថតដោះឱ្យបានល្អ។ ការថតដោះនេះ ចំណាយពេលប្រហែល ២០ នាទី ឯការសង្កត់ដោះឱ្យសំប៉ែតនោះ តែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះ ប្រហែលជាពីរ ឬបីវិនាទី។

ឯកសារជំនួយ :

- 1) AAPCHO - www.aapcho.com
- 2) American Cancer Society – Cancer Facts for Women
- 3) www.aphiahf.org/cancerfacts.html 11/19/00
- 4) www.cancer.org
- 5) www.yourcancerrisk.harvard.edu
- 6) www.cancernet.org