

## Fever and Acetaminophen (Tylenol ®)

## La Fiebre y el Acetaminofén (Tylenol ®)

Paciente \_\_\_\_\_

Si el cuerpo de su niño(a) se siente caliente su niño(a) puede tener lo que los doctores llaman "fiebre". Los doctores toman la temperatura con un termómetro. Si el termómetro marca 100.4° F (38° C ), ésto significa que su niño( a ) tiene fiebre y que su cuerpo está más caliente de lo que normalmente debe estar. En la mayoría de las veces esto significa que el niño(a) tiene una enfermedad . Algunas veces a los niños les da fiebre después de haberse vacunado. Algunas veces sus cuerpos se sienten más calientes porque han estado jugando mucho o usando demasiada ropa, no que están enfermos.

La "fiebre" por si sola no es mala. La fiebre en realidad puede ayudar al cuerpo a pelear contra alguna infección. Sin embargo, las fiebres hacen que muchos niños se sientan mal, así que en general las fiebres se quitan con una medicina que se llama acetaminofén. El Tylenol ® es el nombre que comúnmente recibe el acetaminofén.

El como su niño(a) actúe es más importante que cuanto tenga de fiebre. Si el niño(a) tiene una fiebre de 103° F, pero se ve contento(a), juega y come; este niño(a) probablemente este bién. Si su niño(a) tiene una fiebre de sólamente 101° F, pero tiene problemas para respirar, se ve con mucho sueño, llorón(a); este niño(a) a lo mejor esta muy enfermo(a).

Además de Tylenol ® hay otras cosas que usted puede hacer para ayudar al niño(a):

- Vista al niño(a) sin mucha ropa. Envuélvalo sin tantas mantas o frazadas.
- Trate de que el niño(a) tome bastante líquidos.
- Puede ponerle una toalla medio fría en la frente. NO USE agua fría, hielo o alcohol medicinal.

Por favor llame a su proveedor(a) de atención médica **inmediatamente** si su niño(a) tiene lo siguiente:

- Tortícolis-cuello entumecido-, dolor de cabeza, actúa confundido(a)
- Escalofríos
- Duerme demasiado

- Lloro o se siente demasiado molesto(a)
- Dificultad para respirar o que cuando respira se le siente un ruido
- Erupción de color morada
- Su niño(a) tiene menos de 3 meses y tiene una temperatura de más de 100°F (38°C)
- Si la fiebre de su niño(a) le ha durado por más de 3 días
- Su niño(a) siente dolor (aún después de haber tomado Tylenol®)
- Su niño(a) se ve más enfermo(a) o si usted está preocupado(a) por él o ella
- Su niño parece estar más enfermo, o usted está preocupado

Finalmente, NUNCA le de aspirina a su niño(a), a menos que su doctor le diga. Tylenol® baja la fiebre causada por una infección o después que al niño(a) se le hayan puesto las vacunas. También ayuda a aliviar molestias menores o dolores causados por un resfriado común o cuando le están saliendo los dientes.

**Gotas** (80mg/0.8m)

Dosis: De \_\_\_ mls cada 4-6 horas si se necesita para aliviar la fiebre o el dolor. No más de 4 dosis en 24 horas.

**Suspensión** (160mg/5mls)

Dosis: De \_\_\_ mls (\_\_\_ cucharaditas) cada 4-6 horas si se necesita para aliviar la fiebre o el dolor. No más de 4 dosis en 24 horas.

**Tabletas Masticables** (80mg)

Dosis: De \_\_\_ mls cada 4-6 horas cuando si se necesita para aliviar la fiebre o el dolor. No más de 4 dosis en 24 horas.

**Tabletas de Fuerza Regular** (325mg)

Dosis: Tome \_\_\_ tabletas cada 4-6 horas si se necesita para aliviar la fiebre o el dolor. No más de 12 tabletas en 24 horas.

*No se use con otras medicinas que tengan acetaminofén (Tylenol®)*

*Evite el alcohol*

Si tiene preguntas sobre sus medicamentos, por favor llame a la clínica.